

EPIKRISENS AVSNITT "MEDISINER VED UTREISE"

Dette dokumentet er ment som en veiledning og mal for utforming av epikrisens legemiddelsnitt. Epikrisen er et viktig grunnlag for fastlegene som skal samstemme pasientens medisinliste i etterkant av oppholdet. Det er derfor viktig at struktur og innhold er korrekt.

1. Oppgi kilde til legemiddellisten

Eksempel: Faste medisiner ved innleggelsen bygger på legemiddelliste fra fastlegen.

2. Begrunn endringer i faste medisiner

Eksempel: Begrunnelse for endringer under oppholdet:

- Warfarin er innført pga. kronisk atrieflimmer med CHA2DS2VASc: 3
- Simvastatin økt fra 20 til 40mg pga. LDL>2,0 og kjent koronarsykdom.
- Furosemid er seponert pga. usikker indikasjon.

3. Lag liste over medisiner ved utreise

Seponerte føres nederst adskilt fra medisiner i bruk.

4. Alle medisiner skal beskrives med navn, generisk navn, entydig dosering, indikasjon og kategori.

5. Kategori føres etter hvert legemiddel, med store bokstaver

Samtlige legemidler merkes med en av følgende kategorier:

- SOM FØR
- NY
- ENDRET
- KUR
- SLUTT*

* Bruk ordet SLUTT i stedet for SEPONERT. Pasientens medisinliste ved utreise (eventuelt som en del av "Epikrise rett i hånden") være forståelig for pasienten og pårørende. Derfor skal norske ord brukes. En medisinliste fra fastlege kan inneholde "varer i bruk", slik som inkontinensutstyr, glukometer-stix etc. Dette utelates i kurve, sykehusjournal, epikrise og medisinliste ved utreise.

"SNEKS" er huskeregel for kategoriene SOM FØR - NY - ENDRET - KUR - SLUTT.



Eksempel på legemiddelavsnittet i en epikrise:

Faste medisiner ved innleggelsen bygger på skriftlige opplysninger fra hjemmesykepleier.

Medisiner ved utreise:

Cozaar (Losartan) 50 mg, 1 tablett morgen. Blodtrykksmedisin. SOM FØR

Selo-Zok (Metoprolol depot) 100 mg, 1 tablett daglig. Hjertemedisin. SOM FØR

Marevan (Warfarin) 2,5 mg. Følg eget dosekort. Forebygger blodpropp. NY

Simvastatin 40 mg, 1 tablett kveld. Kolesterolsenkende. ENDRET

Imovane (Zopiclon) 7,5 mg, 1/2 tablett kveld ved behov. Sovemedisin. SOM FØR

Amoxicillin 500mg 1 tabl. 3 ganger daglig mot luftveisinfeksjon t.o.m. 20. mai. KUR

Furix (Furosemid) 20 mg, 1 tablett morgen. Vanndrivende. SLUTT